

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

## 1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tremfya 100 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.  
Tremfya 100 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.

## 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Tremfya 100 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 100 mg guselkumab i 1 ml opløsning.

Tremfya 100 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt pen indeholder 100 mg guselkumab i 1 ml opløsning.

Guselkumab er et fuldt humant immunoglobulin G1-lamda (IgG1 $\lambda$ ) monoklonalt antistof (mAb) mod proteinet interleukin (IL)-23, som fremstilles i ovarieceller fra kinesiske hamstere (CHO) vha. rekombinant DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

## 3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion)

Opløsningen er klar og farveløs til lys gul.

## 4. KLINISKE OPLYSNINGER

### 4.1 Terapeutiske indikationer

Plaque-psoriasis

Tremfya er indiceret til behandling af moderat til svær plaque-psoriasis hos voksne, som er kandidater til systemisk behandling.

Psoriasisartrit

Tremfya alene eller i kombination med methotrexat (MTX) er indiceret til behandling af aktiv psoriasisartrit hos voksne patienter, som har haft et utilstrækkeligt respons på, eller som har været intolerante over for, en forudgående behandling med et sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel (DMARD) (se pkt. 5.1).

### 4.2 Dosering og administration

Tremfya er beregnet til brug under vejledning og tilsyn af en læge, der har erfaring med diagnosticering og behandling af lidelser, for hvilke Tremfya er indiceret.

## Dosering

### *Plaque-psoriasis*

Den anbefalede dosis af Tremfya er 100 mg som subkutan injektion ved uge 0 og 4 efterfulgt af en vedligeholdelsesdosis hver 8. uge.

Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som ikke har udvist respons efter 16 ugers behandling.

### *Psoriasisartrit*

Den anbefalede dosis af Tremfya er 100 mg som subkutan injektion ved uge 0 og 4 efterfulgt af en vedligeholdelsesdosis hver 8. uge. For patienter med klinisk vurderet høj risiko for ledskader kan det overvejes at give en dosis på 100 mg hver 4. uge (se pkt. 5.1).

Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som ikke har vist respons efter 24 ugers behandling.

## Særlige populationer

### *Ældre ( $\geq 65$ år)*

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Der foreligger begrænsede data om patienter i alderen  $\geq 65$  år og meget begrænsede data om patienter i alderen  $\geq 75$  år (se pkt. 5.2).

### *Nedsat nyre- eller leverfunktion*

Tremfya er ikke undersøgt hos disse patientpopulationer. Der kan ikke gives anbefalinger vedrørende dosis. Yderligere oplysninger om eliminering af guselkumab findes i pkt. 5.2.

### *Pædiatrisk population*

Tremfyas sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

## Administration

Subkutan anvendelse. Hvis det er muligt, skal hudområder med aktiv psoriasis undgås som injektionssteder.

Efter passende træning i subkutan injektionsteknik, kan patienterne selv injicere Tremfya, hvis en læge beslutter, at det er hensigtsmæssigt. Lægen skal dog sikre sig, at der sker den nødvendige medicinske opfølgning. Patienterne skal have besked på at injicere den fulde mængde af Tremfya i henhold til „Brugsanvisning“, som medfølger i kartonen.

Yderligere instruktion om klargøring og særlige forholdsregler for håndtering findes i pkt. 6.6 samt i folderen „Brugsanvisning“.

## **4.3 Kontraindikationer**

Alvorlig overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Klinisk betydningsfulde aktive infektioner (f.eks. aktiv tuberkulose; se pkt. 4.4).

## **4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen**

### Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og batchnummer tydeligt registreres.

### Infektioner

Tremfya kan øge risikoen for infektion. Der må ikke påbegyndes behandling med Tremfya hos patienter med en klinisk betydningsfuld aktiv infektion, før infektionen har fortaget sig eller er passende behandlet.

Patienter i behandling med Tremfya skal have besked på at søge læge, hvis der opstår tegn eller symptomer på klinisk betydningsfuld kronisk eller akut infektion. Hvis patienten udvikler en klinisk betydningsfuld eller alvorlig infektion, eller ikke responderer på standardbehandling, skal patienten overvåges nøje, og Tremfya skal seponeres, indtil infektionen har fortaget sig.

### Undersøgelse for tuberkulose inden behandling

Inden behandling med Tremfya påbegyndes, skal patienten undersøges for tuberkuloseinfektion. Patienter, der får Tremfya, skal overvåges nøje for tegn og symptomer på aktiv tuberkulose under og efter behandlingen. Antituberkuløs behandling skal overvejes, inden behandling med Tremfya påbegyndes hos patienter med latent eller aktiv tuberkulose i anamnesen, hvor et tidligere adækvat behandlingsforløb ikke kan bekræftes.

### Overfølsomhed

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er blevet rapporteret efter markedsføringen. Nogle alvorlige overfølsomhedsreaktioner forekom adskillige dage efter behandling med guselkumab, herunder tilfælde af urticaria og dyspnø. Hvis der opstår en alvorlig overfølsomhedsreaktion, skal administration af Tremfya seponeres med det samme og passende behandling iværksættes.

### Forhøjede levertransaminaser

I kliniske studier af psoriasisartrit blev der observeret en øget forekomst af forhøjede leverenzymmer hos patienter, der fik behandling med Tremfya hver 4. uge, sammenlignet med patienter, der fik behandling med Tremfya hver 8. uge eller placebo (se pkt. 4.8, tabel 2).

Ved ordination af Tremfya hver 4. uge til patienter med psoriasisartrit anbefales det at vurdere leverenzymmer ved baseline og derefter i henhold til rutinemæssig patientbehandling. Hvis der observeres stigninger i alaninaminotransferase [ALAT] eller aspartataminotransferase [ASAT], og der er formodning om lægemiddelinduceret leverskade, skal behandlingen med Tremfya afbrydes midlertidigt, indtil denne diagnose er udelukket.

### Vaccinationer

Inden behandling med Tremfya påbegyndes, skal det overvejes at sikre, at patienten har fået alle relevante vaccinationer i henhold til aktuelle retningslinjer for vaccination. Levende vacciner bør ikke anvendes til patienter, som samtidigt behandles med Tremfya. Der foreligger ingen data om respons på levende eller inaktive vacciner.

Inden vaccination med levende vira eller levende bakterier skal behandling med Tremfya afbrydes i mindst 12 uger efter den sidste dosis og behandlingen kan genoptages mindst 2 uger efter vaccinationen. Den ordinerende læge skal læse produktresuméet for den specifikke vaccine for at få yderligere oplysninger om og vejledning i samtidig brug af immunsupprimerende midler efter vaccination.

## **4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion**

### Interaktioner med CYP450-substrater

I et fase 1-studie hos forsøgspersoner med moderat til svær plaque-psoriasis var ændringer i systemisk eksponering ( $C_{max}$  og  $AUC_{inf}$ ) for midazolam, S-warfarin, omeprazol, dextromethorphan og koffein efter en enkelt dosis af guselkumab ikke klinisk relevante, hvilket tyder på ringe sandsynlighed for lægemiddelinteraktion mellem guselkumab og substrater for forskellige CYP-enzymmer (CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 og CYP1A2). Dosisjustering er ikke nødvendig ved samtidig administration af guselkumab og CYP450-substrater.

### Samtidig immunsupprimerende behandling eller lysbehandling

Sikkerheden og virkningen af Tremfya i kombination med immunsuppressiva, herunder biologiske lægemidler, eller lysbehandling er ikke blevet vurderet i psoriasisstudier.

## 4.6 Fertilitet, graviditet og amning

### Fertile kvinder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 12 uger efter behandlingen.

### Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af guselkumab til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditeten, den embryonale/føtale udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld bør Tremfya undgås under graviditeten.

### Amning

Det er ukendt, om guselkumab udskilles i human mælk. Det vides, at humane IgG'er udskilles i brystmælk i løbet af de første få dage efter fødslen, for kort tid derefter at falde til lave koncentrationer. Derfor kan en risiko for det ammede spædbarn i løbet af denne periode ikke udelukkes. Det skal besluttes, om behandlingen med Tremfya skal seponeres eller slet ikke igangsættes, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til fordelene ved behandling med Tremfya for kvinden. Se pkt. 5.3 for oplysninger om udskillelse af guselkumab i mælk hos dyr (cynomolgusaber).

### Fertilitet

Virkningen af guselkumab på human fertilitet er ikke blevet vurderet. Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår fertilitet (se pkt. 5.3).

## 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Tremfya påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

## 4.8 Bivirkninger

### Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige bivirkninger var luftvejsinfektioner.

### Bivirkninger opstillet i tabelform.

Tabel 1 viser en liste over bivirkninger fra kliniske studier med psoriasis og psoriasisartrit samt erfaring efter markedsføringen. Bivirkningerne er klassificeret efter MedDRA-systemorganklasse og hyppighed med følgende konvention: meget almindelig ( $\geq 1/10$ ), almindelig ( $\geq 1/100$  til  $< 1/10$ ), ikke almindelig ( $\geq 1/1\ 000$  til  $< 1/100$ ), sjælden ( $\geq 1/10\ 000$  til  $< 1/1\ 000$ ), meget sjælden ( $< 1/10\ 000$ ), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

**Tabel 1: Oversigt over bivirkninger**

Systemorganklasse	Hyppighed	Bivirkning
Infektioner og parasitære sygdomme	Meget almindelig	Luftvejsinfektioner
	Ikke almindelig	Herpes simplex-infektioner
	Ikke almindelig	Tinea-infektioner
	Ikke almindelig	Gastroenteritis
Immunsystemet	Ikke almindelig	Overfølsomhed
	Ikke almindelig	Anafylaksi
Nervesystemet	Almindelig	Hovedpine
Mave-tarm-kanalen	Almindelig	Diarré
Hud og subkutane væv	Ikke almindelig	Urticaria
	Ikke almindelig	Udslæt
Knogler, led, muskler og bindevæv	Almindelig	Artralgi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet	Almindelig	Reaktioner på injektionsstedet
Undersøgelser	Almindelig	Forhøjede transaminaser
	Ikke almindelig	Nedsat neutrofilital

### Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

#### Forhøjede transaminaser

I to kliniske fase III-studier med psoriasisartrit blev der i den placebokontrollerede periode hyppigere rapporteret bivirkninger i form af forhøjede transaminaser (herunder forhøjet ALAT, forhøjet ASAT, forhøjede leverenzymmer, forhøjede transaminaser, unormal leverfunktionstest, hypertransaminasæmi) i de grupper, der blev behandlet med Tremfya (8,6 % i den gruppe, der fik behandling hver 4. uge, og 8,3 % i den gruppe, der fik behandling hver 8. uge), i forhold til placebogruppen (4,6 %). Til og med 1 år blev der rapporteret bivirkninger i form af forhøjede transaminaser (som ovenfor) hos 12,9 % af patienterne i den gruppe, der fik behandling hver 4. uge, og 11,7 % af patienterne i den gruppe, der fik behandling hver 8. uge.

På baggrund af laboratorievurderinger var de fleste transaminaseforhøjelser (ALAT og ASAT)  $\leq 3$  x øvre grænse for normal (ULN). Transaminaseforhøjelser fra  $> 3$  til  $\leq 5$  x ULN og  $> 5$  x ULN var ikke hyppige og forekom oftere i den gruppe, der fik Tremfya hver 4. uge, sammenlignet med den gruppe, der fik Tremfya hver 8. uge (tabel 2). Et lignende mønster for hyppighed, fordelt på sværhedsgrad og behandlingsgruppe, blev observeret indtil afslutningen af det 2-årige kliniske fase III-studie med psoriasisartrit.

**Tabel 2: Hyppighed af patienter med transaminaseforhøjelser efter *baseline* i to kliniske fase III-studier med psoriasisartrit**

	Til og med uge 24 <sup>a</sup>			Til og med 1 år <sup>b</sup>	
	Placebo N = 370 <sup>c</sup>	Tremfya 100 mg hver 8. uge N = 373 <sup>c</sup>	Tremfya 100 mg hver 4. uge N = 371 <sup>c</sup>	Tremfya 100 mg hver 8. uge N = 373 <sup>c</sup>	Tremfya 100 mg hver 4. uge N = 371 <sup>c</sup>
<b>ALAT</b>					
> 1 til $\leq 3$ x ULN	30,0 %	28,2 %	35,0 %	33,5 %	41,2 %
> 3 til $\leq 5$ x ULN	1,4 %	1,1 %	2,7 %	1,6 %	4,6 %
> 5 x ULN	0,8 %	0,8 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %
<b>ASAT</b>					
> 1 til $\leq 3$ x ULN	20,0 %	18,8 %	21,6 %	22,8 %	27,8 %
> 3 til $\leq 5$ x ULN	0,5 %	1,6 %	1,6 %	2,9 %	3,8 %
> 5 x ULN	1,1 %	0,5 %	1,6 %	0,5 %	1,6 %

<sup>a</sup> placebokontrolleret periode

<sup>b</sup> patienter, som var randomiseret til placebo ved *baseline* og overgik til Tremfya, er ikke medtaget

<sup>c</sup> antal patienter med mindst én vurdering efter *baseline* for den specifikke laboratorietest inden for perioden

I de kliniske studier med psoriasis over en periode på 1 år var hyppigheden af transaminaseforhøjelser (ALAT og ASAT) for den gruppe, der fik Tremfya hver 8. uge, den samme som den, der blev set hos den gruppe, der fik Tremfya hver 8. uge i studierne med psoriasisartrit. Over en periode på 5 år steg forekomsten af transaminaseforhøjelse ikke pr. år med guselkumab-behandling. De fleste transaminaseforhøjelser var  $\leq 3$  x ULN.

I de fleste tilfælde var transaminaseforhøjelserne forbigående og medførte ikke seponering af behandlingen.

#### Nedsat neutrofilital

I to kliniske fase III-studier med psoriasisartrit blev der i den placebokontrollerede periode hyppigere rapporteret bivirkninger i form af nedsat neutrofilital i den gruppe, der blev behandlet med Tremfya (0,9 %), end i placebogruppen (0 %). Til og med 1 år blev der rapporteret bivirkninger i form af nedsat neutrofilital hos 0,9 % af de patienter, der fik behandling med Tremfya. I de fleste tilfælde var

nedgangen i neutrofilital i blodet let, forbigående og ikke forbundet med infektion og førte ikke til seponering af behandlingen.

#### *Gastroenteritis*

I den placebokontrollerede periode i to kliniske fase III-studier med psoriasis forekom gastroenteritis hyppigere i den gruppe, der blev behandlet med Tremfya (1,1 %), end i placebogruppen (0,7 %). Til og med uge 264 rapporterede 5,8 % af alle de patienter, der blev behandlet med Tremfya, gastroenteritis. Gastroenteritis som bivirkning var ikke af svær grad og medførte ikke seponering af Tremfya til og med uge 264. Hyppigheden af observeret gastroenteritis i kliniske studier med psoriasisartrit i den placebokontrollerede periode var den samme som den, der blev observeret i de kliniske studier med psoriasis.

#### *Reaktioner på injektionsstedet*

I perioden til og med uge 48 i to kliniske fase III-studier med psoriasis var 0,7 % af injektionerne af Tremfya og 0,3 % af injektionerne af placebo forbundet med reaktioner på injektionsstedet. Til og med uge 264 var 0,4 % af injektionerne med Tremfya forbundet med reaktioner på injektionsstedet. Reaktioner på injektionsstedet var generelt af let til moderat sværhedsgrad, ingen var alvorlige og én førte til seponering af Tremfya.

I to kliniske fase III-studier med psoriasisartrit var antallet af forsøgspersoner, som rapporterede 1 eller flere reaktioner på injektionsstedet til og med uge 24, lavt og lidt højere i Tremfya-grupperne end i placebogruppen: 5 (1,3 %) forsøgspersoner i den gruppe, der fik Tremfya hver 8. uge, 4 (1,1 %) forsøgspersoner i den gruppe, der fik Tremfya hver 4. uge og 1 (0,3 %) i den gruppe, der fik placebo. Én patient seponerede Tremfya på grund af en reaktion på injektionsstedet i den placebokontrollerede periode af de kliniske studier med psoriasisartrit. Til og med 1 år var andelen af forsøgspersoner, som rapporterede 1 eller flere reaktioner på injektionsstedet, 1,6 % og 2,4 % i henholdsvis den gruppe, der fik behandling hver 8. uge, og den gruppe, der fik behandling hver 4. uge. Samlet set var forekomsten af injektioner forbundet med reaktioner på injektionsstedet, der blev observeret i den placebokontrollerede periode i de kliniske studier med psoriasisartrit, den samme som den observerede forekomst i de kliniske studier med psoriasis.

#### *Immunogenicitet*

Tremfyas immunogenicitet blev vurderet med en sensitiv og lægemiddeltolerant immunanalyse.

I puljede fase II- og fase III-analyser af patienter med psoriasis og psoriasisartrit udviklede 5 % (n = 145) af de patienter, der blev behandlet med Tremfya, antistoffer mod lægemidlet i løbet af op til 52 ugers behandling. Af de patienter, som udviklede antistoffer mod lægemidlet, havde ca. 8 % (n = 12) antistoffer, som blev klassificeret som neutraliserende, hvilket svarer til 0,4 % af alle patienter, der blev behandlet med Tremfya. I puljede fase III-analyser af patienter med psoriasis udviklede cirka 15 % af de patienter, der blev behandlet med Tremfya, antistoffer mod lægemidlet i løbet af op til 264 ugers behandling. Af de patienter, som udviklede antistoffer mod lægemidlet, havde ca. 5 % antistoffer, som blev klassificeret som neutraliserende, hvilket svarer til 0,76 % af alle patienter, som fik behandling med Tremfya. Antistoffer mod lægemidlet var ikke forbundet med ringere virkning eller udvikling af reaktioner på injektionsstedet.

#### Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

## 4.9 Overdosering

Intravenøse enkeltdoser af guselkumab på op til 987 mg (10 mg/kg) er blevet administreret til raske frivillige, og en enkelt subkutan dosis af guselkumab på op til 300 mg er blevet administreret til patienter med plaque-psoriasis i kliniske studier uden dosisbegrænsende toksicitet. I tilfælde af overdosering anbefales det at overvåge patienten for tegn eller symptomer på bivirkninger samt at iværksætte passende symptomatisk behandling øjeblikkeligt.

## 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

### 5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunsuppressiva, interleukinhæmmere, ATC-kode: L04AC16.

#### Virkningsmekanisme

Guselkumab er et humant monoklonalt IgG1 $\lambda$ -antistof (mAb), som binder selektivt til proteinet IL-23 (interleukin 23) med høj specificitet og affinitet. IL-23 er et regulatorisk cytokin, som påvirker differentiering, ekspansion og overlevelse af en subgruppe af T-celler (f.eks. Th17-celler og Tc17-celler) og medfødte subgrupper af immunceller, som producerer effektor-cytokiner, herunder IL-17A, IL-17F og IL-22, som driver inflammatorisk sygdom. Hos mennesker viste selektiv blokade af IL-23 at normalisere produktionen af disse cytokiner.

Patienter med plaque-psoriasis har forhøjede IL-23-niveauer i huden. I *in vitro*-modeller blev det påvist, at guselkumab hæmmer bioaktiviteten af IL-23 ved at blokere dets interaktion med IL-23-receptorer på celleoverfladen, hvilket forstyrrer IL-23-medieret signal-, aktiverings- og cytokin-kaskader. Guselkumabs kliniske virkning på plaque-psoriasis og psoriasisartrit sker gennem blokade af IL-23-cytokinet.

#### Farmakodynamisk virkning

I et fase I-studie resulterede behandling med guselkumab i reduceret ekspresion af IL-23/Th17-gener og psoriasis-forbundne genekspressionsprofiler, påvist ved analyser af mRNA indhentet fra biopsier af aktive plaques fra patienter med plaque-psoriasis i uge 12 sammenlignet med *baseline*. I det samme fase I studie resulterede behandling med guselkumab i forbedring af histologiske målinger af psoriasis i uge 12, inklusive reduktioner i epidermal tykkelse og T-celledensitet. Desuden blev der observeret reducerede serumkoncentrationer af IL-17A, IL-17F og IL-22 sammenlignet med placebo hos patienter behandlet med guselkumab i fase II- og fase III-studier med plaque-psoriasis. Disse resultater stemmer overens med den kliniske fordel, der er observeret ved behandling af plaque-psoriasis med guselkumab.

Hos patienter med psoriasisartrit i fase III-studier var serumkoncentrationerne af akutfaseproteinerne C-reaktivt protein, serumamyloid A og IL-6 samt Th17-effektorcytokinerne IL-17A, IL-17F og IL22 forhøjede ved *baseline*. Guselkumab nedsatte koncentrationerne af disse proteiner inden for 4 uger efter behandlingens begyndelse. Guselkumab reducerede yderligere niveauerne af disse proteiner ved uge 24 i forhold til *baseline* og i forhold til placebo.

#### Klinisk virkning og sikkerhed

##### Plaque-psoriasis

Guselkumabs sikkerhed og virkning blev vurderet i tre randomiserede, dobbeltblinde, aktivt kontrollerede fase III-studier hos voksne patienter med moderat til svær plaque-psoriasis, som var kandidater til lysbehandling eller systemisk behandling.

##### *VOYAGE 1 og VOYAGE 2*

To studier (VOYAGE 1 og VOYAGE 2) vurderede guselkumabs virkning og sikkerhed *versus* placebo og adalimumab hos 1 829 voksne patienter. De patienter, der blev randomiseret til guselkumab (n = 825), fik 100 mg i uge 0 og 4 og hver 8. uge herefter indtil uge 48 (VOYAGE 1) og

uge 20 (VOYAGE 2). De patienter, der blev randomiseret til adalimumab (n = 582), fik 80 mg i uge 0 og 40 mg i uge 1 efterfulgt af 40 mg hver 2. uge indtil uge 48 (VOYAGE 1) og uge 23 (VOYAGE 2). I begge studier fik de patienter, der blev randomiseret til placebo (n = 422), 100 mg guselkumab i uge 16, 20 samt hver 8. uge derefter. I VOYAGE 1 begyndte alle patienter, herunder dem, der blev randomiseret til adalimumab i uge 0, at få ikke-blindet guselkumab hver 8. uge fra uge 52. I VOYAGE 2 blev de patienter, der blev randomiseret til guselkumab i uge 0, som var PASI 90-respondere (Psoriasis Area and Severity Index) i uge 28, randomiseret igen til enten at fortsætte behandling med guselkumab hver 8. uge (vedligeholdelsesbehandling) eller at få placebo (seponeringsbehandling). Seponeringsbehandlede patienter genoptog behandlingen med guselkumab (administreret på tidspunktet for genoptagelse af behandlingen, 4 uger senere og derefter hver 8. uge), hvis de oplevede mindst 50 % tab af deres PASI-forbedring i uge 28. Patienter, der blev randomiseret til adalimumab i uge 0, som var PASI 90-non-respondere, fik guselkumab i uge 28, 32 og hver 8. uge derefter. I VOYAGE 2 begyndte alle patienter at få ikke-blindet guselkumab hver 8. uge fra uge 76.

Sygdomskaraktieristika ved *baseline* svarede til hinanden for undersøgelsespopulationerne i VOYAGE 1 og 2, med et median legemsoverfladeareal (BSA) på henholdsvis 22 % og 24 %, en median PASI-score ved *baseline* på 19 for begge studier, en median score for indeks for dermatologisk livskvalitet (DLQI) ved *baseline* på henholdsvis 14 og 14,5, en score for *Investigator Global Assessment* (IGA) ved *baseline* på svær for henholdsvis 25 % og 23 % af patienterne samt psoriasisartrit i anamnesen for henholdsvis 19 % og 18 % af patienterne.

Af alle de patienter, der deltog i VOYAGE 1 og 2, var henholdsvis 32 % og 29 % behandlingsnaive for både konventionel systemisk og biologisk behandling, henholdsvis 54 % og 57 % havde tidligere fået lysbehandling og henholdsvis 62 % og 64 % havde tidligere fået konventionel systemisk behandling. I begge studier havde 21 % tidligere fået biologisk behandling; 11 % havde fået mindst en TNF $\alpha$ -hæmmer (tumornekrosefaktor alfa) og ca. 10 % havde fået en IL-12/IL-23-hæmmer.

Virkningen af guselkumab blev vurderet i forhold til overordnet hudsygdom, regional sygdom (hovedbund, hænder og fødder og negle) samt livskvalitet og patientrapporterede resultater. Der var to primære endepunkter i VOYAGE 1 og 2: andelen af patienter, som opnåede en IGA-score på *clear* eller minimal (IGA 0/1), og et PASI 90-respons i uge 16 *versus* placebo (se tabel 3).

#### Overordnet hudsygdom

Behandling med guselkumab resulterede i signifikante forbedringer i målinger af sygdomsaktivitet sammenlignet med placebo og adalimumab i uge 16 og sammenlignet med adalimumab i uge 24 og 48. De vigtigste resultater for virkning for de primære og sekundære endepunkter fremgår af tabel 3 nedenfor.

**Tabel 3: Oversigt over klinisk respons i VOYAGE 1 og VOYAGE 2**

	Antal patienter (%)					
	Placebo (n = 174)	VOYAGE 1		Placebo (n = 248)	VOYAGE 2	
		guselkumab (n = 329)	adalimumab (n = 334)		guselkumab (n = 496)	adalimumab (n = 248)
<b>Uge 16</b>						
PASI 75	10 (5,7)	300 (91,2) <sup>a</sup>	244 (73,1) <sup>b</sup>	20 (8,1)	428 (86,3) <sup>a</sup>	170 (68,5) <sup>b</sup>
PASI 90	5 (2,9)	241 (73,3) <sup>c</sup>	166 (49,7) <sup>b</sup>	6 (2,4)	347 (70,0) <sup>c</sup>	116 (46,8) <sup>b</sup>
PASI 100	1 (0,6)	123 (37,4) <sup>a</sup>	57 (17,1) <sup>d</sup>	2 (0,8)	169 (34,1) <sup>a</sup>	51 (20,6) <sup>d</sup>
IGA 0/1	12 (6,9)	280 (85,1) <sup>c</sup>	220 (65,9) <sup>b</sup>	21 (8,5)	417 (84,1) <sup>c</sup>	168 (67,7) <sup>b</sup>
IGA 0	2 (1,1)	157 (47,7) <sup>a</sup>	88 (26,3) <sup>d</sup>	2 (0,8)	215 (43,3) <sup>a</sup>	71 (28,6) <sup>d</sup>
<b>Uge 24</b>						
PASI 75	-	300 (91,2)	241 (72,2) <sup>c</sup>	-	442 (89,1)	176 (71,0) <sup>c</sup>
PASI 90	-	264 (80,2)	177 (53,0) <sup>b</sup>	-	373 (75,2)	136 (54,8) <sup>b</sup>
PASI 100	-	146 (44,4)	83 (24,9) <sup>c</sup>	-	219 (44,2)	66 (26,6) <sup>c</sup>
IGA 0/1	-	277 (84,2)	206 (61,7) <sup>b</sup>	-	414 (83,5)	161 (64,9) <sup>b</sup>
IGA 0	-	173 (52,6)	98 (29,3) <sup>b</sup>	-	257 (51,8)	78 (31,5) <sup>b</sup>
<b>Uge 48</b>						
PASI 75	-	289 (87,8)	209 (62,6) <sup>c</sup>	-	-	-
PASI 90	-	251 (76,3)	160 (47,9) <sup>b</sup>	-	-	-
PASI 100	-	156 (47,4)	78 (23,4) <sup>c</sup>	-	-	-



IGA 0/1	-	265 (80,5)	185 (55,4) <sup>b</sup>	-	-	-
IGA 0	-	166 (50,5)	86 (25,7) <sup>b</sup>	-	-	-

<sup>a</sup> p < 0,001 for sammenligning mellem guselkumab og placebo.

<sup>b</sup> p < 0,001 for sammenligning mellem guselkumab og adalimumab for de vigtigste sekundære endepunkter.

<sup>c</sup> p < 0,001 for sammenligningerne mellem guselkumab og placebo for de co-primære endepunkter.


<sup>d</sup> der blev ikke foretaget sammenligninger mellem guselkumab og adalimumab.

<sup>e</sup> p < 0,001 for sammenligninger mellem guselkumab og adalimumab.

### Respons over tid


Guselkumab viste hurtig indledende virkning med en signifikant højere procentvis forbedring i PASI sammenlignet med placebo allerede i uge 2 (p < 0,001). Procentdelen af patienter, som opnåede et PASI 90-respons, var numerisk højere for guselkumab end adalimumab startende i uge 8. Forskellen nåede et maksimum omkring uge 20 (VOYAGE 1 og 2) og blev opretholdt til og med uge 48 (VOYAGE 1) (se figur 1).

**Figur 1: Procentdel af forsøgspersoner, som opnåede et PASI 90-respons til og med uge 48 per besøg (forsøgspersoner randomiseret i uge 0) i VOYAGE 1**



I VOYAGE 1 blev PASI 90-responsraten opretholdt fra uge 52 til uge 252 hos patienter, som kontinuerligt fik behandling med guselkumab. Hos patienter, som blev randomiseret til adalimumab i uge 0, og som overgik til guselkumab i uge 52, steg PASI 90-responsraten fra uge 52 til og med uge 76 og blev derefter opretholdt til og med uge 252 (se figur 2).

**Figur 2: Procentdel af forsøgspersoner, som opnåede et PASI 90-respons per besøg i den ikke-blindede fase i VOYAGE 1**



Virningen og sikkerheden af guselkumab blev påvist uanset alder, køn, race, legemsvægt, placering af plaques, PASI-sværhedsgrad ved *baseline*, samtidig psoriasisartrit og tidligere behandling med et biologisk lægemiddel. Guselkumab var virkningsfuldt hos patienter, som var behandlingsnaive over for konventionel systemisk eller biologisk behandling, eller som var behandlingserfarne med biologisk behandling.

I VOYAGE 2 var 88,6 % af de patienter, der fik guselkumab som vedligeholdelsesbehandling, PASI 90-respondere i uger 48 sammenlignet med 36,8 % af de patienter, der fik behandlingen seponeret i uge 28 ( $p < 0,001$ ). Tab af PASI 90-respons blev set så tidligt som 4 uger efter seponering af behandling med guselkumab med en median tid til tab af PASI 90-respons på ca. 15 uger. Blandt de patienter, for hvem behandlingen blev seponeret, og som efterfølgende genoptog behandling med guselkumab, havde 80 % genvundet et PASI 90-respons ved vurdering 20 uger efter genoptagelse af behandlingen.

I VOYAGE 2 opnåede henholdsvis 66 % og 76 % af de 112 patienter, der blev randomiseret til adalimumab, som ikke opnåede et PASI 90-respons i uge 28, et PASI 90-respons efter henholdsvis 20 og 44 ugers behandling med guselkumab. Hertil kommer, at blandt 95 patienter i VOYAGE 2, der blev randomiseret til guselkumab, som ikke opnåede et PASI 90-respons i uge 28, opnåede henholdsvis 36 % og 41 % et PASI 90-respons med yderligere henholdsvis 20 og 44 ugers fortsat behandling med guselkumab. Der blev ikke observeret nogen nye sikkerhedsmæssige aspekter hos patienter, som skiftede fra adalimumab til guselkumab.

### Regional sygdom

I VOYAGE 1 og 2 blev der set signifikante forbedringer af psoriasis i hovedbund, på hænder og fødder, samt i negle (målt ved henholdsvis ss-IGA [Scalp-specific Investigator Global Assessment], hf-PGA [Physician's Global Assessment of Hands and/or Feet], f-PGA [Fingernail Physician's Global Assessment] og NPSI [Nail Psoriasis Severity Index]) hos patienter, der fik behandling med guselkumab, sammenlignet med patienter, der fik behandling med placebo, i uge 16 ( $p < 0,001$ , tabel 4). Guselkumab var bedre end adalimumab for så vidt angår psoriasis i hovedbund samt på

hænder og fødder i uge 24 (VOYAGE 1 og 2) og uge 48 (VOYAGE 1) ( $p \leq 0,001$ , med undtagelse af psoriasis på hænder og fødder i uge 24 [VOYAGE 2] og uge 48 [VOYAGE 1],  $p < 0,05$ ).

**Tablet 4: Oversigt over respons for regional sygdom i VOYAGE 1 og VOYAGE 2**

	VOYAGE 1			VOYAGE 2		
	Placebo	guselkumab	adalimumab	Placebo	guselkumab	adalimumab
<b>ss-IGA (N)<sup>a</sup></b>	145	277	286	202	408	194
ss-IGA 0/1 <sup>b</sup> , n (%)						
Uge 16	21 (14,5)	231 (83,4) <sup>c</sup>	201 (70,3) <sup>d</sup>	22 (10,9)	329 (80,6) <sup>c</sup>	130 (67,0) <sup>d</sup>
<b>hf-PGA (N)<sup>a</sup></b>	43	90	95	63	114	56
hf-PGA 0/1 <sup>b</sup> , n (%)						
Uge 16	6 (14,0)	66 (73,3) <sup>c</sup>	53 (55,8) <sup>d</sup>	9 (14,3)	88 (77,2) <sup>c</sup>	40 (71,4) <sup>d</sup>
<b>f-PGA (N)<sup>a</sup></b>	88	174	173	123	246	124
f-PGA 0/1, n (%)						
Uge 16	14 (15,9)	68 (39,1) <sup>c</sup>	88 (50,9) <sup>d</sup>	18 (14,6)	128 (52,0) <sup>c</sup>	74 (59,7) <sup>d</sup>
<b>NAPSI (N)<sup>a</sup></b>	99	194	191	140	280	140
Forbedring i procent, middeltal (SD)						
Uge 16	-0,9 (57,9)	34,4 (42,4) <sup>c</sup>	38,0 (53,9) <sup>d</sup>	1,8 (53,8)	39,6 (45,6) <sup>c</sup>	46,9 (48,1) <sup>d</sup>

<sup>a</sup> Omfatter kun forsøgspersoner med ss-IGA-, f-PGA- eller hf-PGA-score  $\geq 2$  ved *baseline* eller NAPSI-score ved *baseline*  $> 0$ .

<sup>b</sup> Omfatter kun forsøgspersoner, som opnåede en  $\geq 2$ -grad forbedring fra *baseline* i ss-IGA og/eller hf-PGA.

<sup>c</sup>  $p < 0,001$  for sammenligning mellem guselkumab og placebo for det vigtigste sekundære endepunkt.

<sup>d</sup> Der blev ikke foretaget sammenligninger mellem guselkumab og adalimumab.

<sup>e</sup>  $p < 0,001$  for sammenligning mellem guselkumab og placebo.

#### Helbredsrelateret livskvalitet / patientrapporterede resultater

I både VOYAGE 1 og 2 blev der observeret signifikant større forbedringer i helbredsrelateret livskvalitet som målt ved DLQI (Dermatology Life Quality Index) og i patientrapporterede psoriasis-symptomer (kløe, smerter, brændende fornemmelse, svie og en følelse af, at huden strammer) og -tegn (tør hud, revner, skæl, flagedannelse, rødmen og blødning) som målt ved PSSD (Psoriasis Symptoms and Signs Diary) hos patienter, der blev behandlet med guselkumab, sammenlignet med patienter, der blev behandlet med placebo, i uge 16 (tabel 5). Tegn på forbedring i patientrapporterede resultater blev opretholdt til og med uge 24 (VOYAGE 1 og 2) og uge 48 (VOYAGE 1). I VOYAGE 1 blev disse forbedringer opretholdt i den ikke-blindede fase til og med uge 252 hos patienter, der fik kontinuerlig behandling med guselkumab (tabel 6).

**Tablet 5: Oversigt over patientrapporterede resultater i uge 16 i VOYAGE 1 og VOYAGE 2**

	VOYAGE 1			VOYAGE 2		
	Placebo	guselkumab	adalimumab	Placebo	guselkumab	adalimumab
<b>DLQI,</b> forsøgspersoner med <i>baseline</i> -score	170	322	328	248	495	247
Ændring fra <i>baseline</i> , gennemsnit (standardafvigelse)						
Uge 16	-0,6 (6,4)	-11,2 (7,2) <sup>a</sup>	-9,3 (7,8) <sup>b</sup>	-2,6 (6,9)	-11,3 (6,8) <sup>c</sup>	-9,7 (6,8) <sup>b</sup>
<b>PSSD-symptom-score,</b> forsøgspersoner med <i>baseline</i> -score $> 0$	129	248	273	198	410	200
Symptom-score = 0, n (%)						
Uge 16	1 (0,8)	67 (27,0) <sup>a</sup>	45 (16,5) <sup>b</sup>	0	112 (27,3) <sup>a</sup>	30 (15,0) <sup>b</sup>
<b>PSSD-tegn-score,</b> forsøgspersoner med <i>baseline</i> -score $> 0$	129	248	274	198	411	201
Tegn-score = 0, n (%)						
Uge 16	0	50 (20,2) <sup>a</sup>	32 (11,7) <sup>b</sup>	0	86 (20,9) <sup>a</sup>	21 (10,4) <sup>b</sup>

<sup>a</sup>  $p < 0,001$  for sammenligning mellem guselkumab og placebo.

<sup>b</sup> der blev ikke udført sammenligninger mellem guselkumab og adalimumab.

<sup>c</sup>  $p < 0,001$  for sammenligning mellem guselkumab og placebo for de vigtigste sekundære endepunkter.

**Table 6: Oversigt over patientrapporterede resultater i den ikke-blindede fase i VOYAGE 1**

	guselkumab			adalimumab-guselkumab		
	Uge 76	Uge 156	Uge 252	Uge 76	Uge 156	Uge 252
<b>DLQI-score &gt; 1 ved baseline, n</b>	445	420	374	264	255	235
forsøgspersoner med DLQI 0/1	337 (75,7 %)	308 (73,3 %)	272 (72,7 %)	198 (75,0 %)	190 (74,5 %)	174 (74,0 %)
<b>PSSD-symptom-score, forsøgspersoner med baseline-score &gt; 0</b>	347	327	297	227	218	200
Symptom score = 0, n (%)	136 (39,2 %)	130 (39,8 %)	126 (42,4 %)	99 (43,6 %)	96 (44,0 %)	96 (48,0 %)
<b>PSSD-tegn-score, forsøgspersoner med baseline-score &gt; 0</b>	347	327	297	228	219	201
Tegn-score = 0, n (%)	102 (29,4 %)	94 (28,7 %)	98 (33,0 %)	71 (31,1 %)	69 (31,5 %)	76 (37,8 %)


I VOYAGE 2 havde guselkumab-patienter signifikant større forbedring fra *baseline* sammenlignet med placebo i helbredsrelateret livskvalitet, angst og depression samt begrænsninger vedrørende erhvervssevne i uge 16 målt ved henholdsvis helbredsspørgeskemaet SF-36 (36-item Short Form), HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) og WLQ (Work Limitations Questionnaire). Forbedringerne i SF-36, HADS og WLQ blev alle opretholdt til og med uge 48 og i den ikke-blindede fase til og med uge 252 blandt de patienter, der blev randomiseret til vedligeholdelsesbehandling i uge 28.

#### NAVIGATE

NAVIGATE-studiet undersøgte virkningen af guselkumab hos patienter, som havde et utilstrækkeligt respons (dvs. som ikke opnåede responset „clear“ eller „minimal“ defineret som IGA  $\geq 2$ ) på ustekinumab i uge 16. Alle patienter (n = 871) fik ikke-blindet ustekinumab (45 mg  $\leq$  100 kg og 90 mg  $>$  100 kg) i uge 0 og 4. I uge 16 blev 268 patienter med en IGA  $\geq 2$ -score randomiseret til enten at fortsætte med ustekinumab-behandling (n = 133) hver 12. uge eller at påbegynde guselkumab-behandling (n = 135) i uge 16, 20 og derefter hver 8. uge. *Baseline*-karakteristika for randomiserede patienter var stort set de samme som dem, der blev observeret i VOYAGE 1 og 2.

Efter randomisering var det primære endpoint antallet af besøg efter randomisering mellem uge 12 og 24, hvor patienterne opnåede en IGA-score 0/1 samt havde  $\geq 2$  graders forbedring. Patienterne blev undersøgt hver 4. uge ved i alt fire besøg. Blandt de patienter, der havde utilstrækkeligt respons på ustekinumab på tidspunktet for randomisering, blev der observeret signifikant større forbedring i virkningen hos patienter, som skiftede til guselkumab-behandling, sammenlignet med patienter, som fortsatte med ustekinumab-behandling. Mellem 12 og 24 uger efter randomisering opnåede guselkumab-patienterne en IGA-score 0/1 med  $\geq 2$  graders forbedring dobbelt så hyppigt som ustekinumab-patienterne (middeltal henholdsvis 1,5 *versus* 0,7 besøg,  $p < 0,001$ ). En større andel af guselkumab-patienterne sammenlignet med ustekinumab-patienterne opnåede desuden en IGA-score 0/1 og  $\geq 2$  graders forbedring (henholdsvis 31,1 % *versus* 14,3 %;  $p = 0,001$ ) og et PASI 90-respons (48 % *versus* 23 %;  $p < 0,001$ ) 12 uger efter randomisering. Forskelle i responsrater mellem patienter, der blev behandlet med henholdsvis guselkumab og ustekinumab, blev set allerede 4 uger efter randomisering (henholdsvis 11,1 % og 9,0 %), og de nåede maksimum 24 uger efter randomisering (se figur 3). Der blev ikke observeret nogen nye sikkerhedsmæssige aspekter hos patienter, som skiftede fra ustekinumab til guselkumab.

**Figur 3: Procentdel af forsøgspersoner, som opnåede IGA-scoren *Clear* (0) eller *Minimal* (1) og mindst en 2-graders forbedring i IGA fra uge 0 til og med uge 24 per besøg efter randomisering i NAVIGATE**



#### ECLIPSE

Guselkumabs virkning og sikkerhed sammenlignet med secukinumab blev ligeledes undersøgt i et dobbeltblindt studie. Patienterne blev randomiseret til at få guselkumab (N = 534; 100 mg i uge 0, 4 og hver 8. uge herefter), eller secukinumab (N = 514; 300 mg i uge 0, 1, 2, 3, 4 og hver 4. uge herefter). Den sidste dosis var i uge 44 i begge behandlingsgrupper.

Sygdomskaraktistika ved *baseline* svarede til en population med moderat til svær plaque-psoriasis med et median BSA på 20 %, en median PASI-score på 18 og en IGA-score på svær for 24 % af patienterne.

Guselkumab var bedre end secukinumab målt på det primære endepunkt PASI 90-respons i uge 48 (84,5 % versus 70,0 %,  $p < 0,001$ ). En sammenligning af PASI-responsrater er vist i tabel 7.

**Tabel 7: PASI-responsrater i ECLIPSE**

	Antal patienter (%)	
	guselkumab (N = 534)	secukinumab (N = 514)
<b>Primært endepunkt</b>		
PASI 90-respons i uge 48	451 (84,5 %) <sup>a</sup>	360 (70,0 %)
<b>Vigtigste sekundære endepunkter</b>		
PASI 75-respons i både uge 12 og uge 48	452 (84,6 %) <sup>b</sup>	412 (80,2 %)
PASI 75-respons i uge 12	477 (89,3 %) <sup>c</sup>	471 (91,6 %)
PASI 90-respons i uge 12	369 (69,1 %) <sup>c</sup>	391 (76,1 %)
PASI 100-respons i uge 48	311 (58,2 %) <sup>c</sup>	249 (48,4 %)


<sup>a</sup>  $p < 0,001$  for superioritet

<sup>b</sup>  $p < 0,001$  for non-inferioritet,  $p = 0,062$  for superioritet

<sup>c</sup> der blev ikke udført formel statistisk afprøvning

PASI 90-responsrater for guselkumab og secukinumab til og med uge 48 er vist i figur 4.

**Figur 4: Procentdel af forsøgspersoner, som opnåede et PASI 90-respons til og med uge 48 per besøg (forsøgspersoner randomiseret i uge 0) i ECLIPSE**



#### Psoriasisartrit (PsA)

Det er blevet påvist, at guselkumab forbedrer tegn og symptomer, fysisk funktion og helbredsrelateret livskvalitet samt reducerer progressionsraten for perifer ledsade hos voksne patienter med aktiv PsA.

#### *DISCOVER 1 og DISCOVER 2*

To randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede fase III-studier (DISCOVER 1 og DISCOVER 2) evaluerede guselkumabs sikkerhed og virkning *versus* placebo hos voksne patienter med aktiv PsA ( $\geq 3$  hævede og  $\geq 3$  ømme led samt et CRP-niveau (C-reaktivt protein) på  $\geq 0,3$  mg/dl i DISCOVER 1 og  $\geq 5$  hævede og  $\geq 5$  ømme led samt et CRP-niveau på  $\geq 0,6$  mg/dl i DISCOVER 2), på trods af behandling med et konventionelt syntetisk (cs)DMARD, apremilast eller et nonsteroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID). Patienterne i disse studier havde fået diagnosen PsA på baggrund af klassifikationskriterierne for psoriasisartrit (CASPAR - Classification criteria for Psoriatic Arthritis) med en median varighed af 4 år. Patienter med forskellige undertyper af PsA blev inkluderet i begge studier, herunder polyartikulær artrit med fravær af gigtknuder (40 %), spondylitis med perifer artrit (30 %), asymmetrisk perifer artrit (23 %), involvering af distale interfalangealled (7 %) og arthritus mutilans (1 %). Flere end henholdsvis 65 % og 42 % af patienterne havde entesitis og dactylitis ved *baseline*, og flere end 75 % af patienterne havde psoriasis med hudinvolvering på  $\geq 3$  % BSA. DISCOVER 1 og DISCOVER 2 evaluerede henholdsvis 381 og 739 patienter, som fik behandling med guselkumab 100 mg administreret ved uge 0 og 4 og derefter hver 8. uge eller guselkumab 100 mg hver 4. uge eller placebo. I uge 24 overgik forsøgspersonerne fra begge studier, der havde fået placebo, til at få guselkumab 100 mg hver 4. uge. Ca. 58 % af patienterne i begge studier fortsatte med stabile doser af MTX ( $\leq 25$  mg/uge).

I begge studier havde over 90 % af patienterne tidligere brugt csDMARD. I DISCOVER 1 havde 31 % af patienterne tidligere fået anti-TNF $\alpha$ -behandling. I DISCOVER 2 var alle patienter naive over for biologisk behandling.

### Tegn og symptomer

Behandling med guselkumab medførte signifikante forbedringer i målingerne af sygdomsaktivitet sammenlignet med placebo ved uge 24. Det primære endepunkt i begge studier var den procentdel af patienter, der opnåede et ACR (American College of Rheumatology) 20-respons ved uge 24. De vigtigste virkningsresultater er vist i tabel 8.

**Tabel 8: Kliniske responser i DISCOVER 1 og DISCOVER 2**

	DISCOVER 1			DISCOVER 2		
	Placebo (N = 126)	guselkumab 100 mg hver 8. uge (N = 127)	guselkumab 100 mg hver 4. uge (N = 128)	Placebo (N = 246)	guselkumab 100 mg hver 8. uge (N = 248)	guselkumab 100 mg hver 4. uge (N = 245)
<b>ACR 20-respons</b>						
Uge 16	25,4 %	52,0 % <sup>b</sup>	60,2 % <sup>b</sup>	33,7 %	55,2 % <sup>g</sup>	55,9 % <sup>c</sup>
Forskel fra placebo (95 % CI)	-	26,7 (15,3; 38,1)	34,8 (23,5; 46,0)	-	21,5 (13,1; 30,0)	22,2 (13,7; 30,7)
Uge 24	22,2 %	52,0 % <sup>a</sup>	59,4 % <sup>a</sup>	32,9 %	64,1 % <sup>a</sup>	63,7 % <sup>a</sup>
Forskel fra placebo (95 % CI)	-	29,8 (18,6; 41,1)	37,1 (26,1; 48,2)	-	31,2 (22,9; 39,5)	30,8 (22,4; 39,1)
<b>ACR 50-respons</b>						
Uge 16	12,7 %	22,8 % <sup>d</sup>	26,6 % <sup>c</sup>	9,3 %	28,6 % <sup>g</sup>	20,8 % <sup>c</sup>
Forskel fra placebo (95 % CI)	-	10,2 (1,0; 19,3)	13,9 (4,4; 23,4)	-	19,3 (12,6; 25,9)	11,5 (5,2; 17,7)
Uge 24	8,7 %	29,9 % <sup>b</sup>	35,9 % <sup>b</sup>	14,2 %	31,5 % <sup>g</sup>	33,1 % <sup>c</sup>
Forskel fra placebo (95 % CI)	-	21,4 (12,1; 30,7)	27,2 (17,6; 36,8)	-	17,2 (10,0; 24,4)	18,8 (11,5; 26,1)
<b>ACR 70-respons</b>						
Uge 24	5,6 %	11,8 % <sup>d</sup>	20,3 % <sup>b</sup>	4,1 %	18,5 % <sup>g</sup>	13,1 % <sup>c</sup>
Forskel fra placebo (95 % CI)	-	6,4 (-0,3; 13,1)	14,8 (6,9; 22,7)	-	14,5 (9,1; 19,9)	9,0 (4,1; 13,8)
<b>LS Mean-ændring<sup>i</sup> i DAS 28 (CRP) fra baseline</b>						
Uge 24 <sup>c</sup>	-0,70	-1,43 <sup>b</sup>	-1,61 <sup>b</sup>	-0,97	-1,59 <sup>b</sup>	-1,62 <sup>b</sup>
Forskel fra placebo (95 % CI)	-	-0,73 (-0,98; -0,48)	-0,91 (-1,16; -0,66)	-	-0,61 (-0,80; -0,43)	-0,65 (-0,83; -0,47)
<b>Minimal sygdomsaktivitet (MDA)</b>						
Uge 24	11,1 %	22,8 % <sup>f</sup>	30,5 % <sup>c</sup>	6,1 %	25,0 % <sup>c</sup>	18,8 % <sup>c</sup>
Forskel fra placebo (95 % CI)	-	11,9 (2,9; 20,9)	19,3 (9,7; 28,9)	-	18,9 (12,8; 25,0)	12,7 (7,0; 18,4)
<b>Patienter med <math>\geq 3</math> % BSA og IGA <math>\geq 2</math></b>						
	n = 78	n = 82	n = 89	n = 183	n = 176	n = 184
<b>IGA-respons<sup>h</sup></b>						
Uge 24	15,4 %	57,3 % <sup>b</sup>	75,3 % <sup>b</sup>	19,1 %	70,5 % <sup>b</sup>	68,5 % <sup>b</sup>
Forskel fra placebo (95 % CI)	-	42,0 (28,9; 55,1)	60,0 (48,3; 71,8)	-	50,9 (42,2; 59,7)	49,8 (41,2; 58,4)
<b>PASI 90-respons</b>						
Uge 16	10,3 %	45,1 % <sup>e</sup>	52,8 % <sup>e</sup>	8,2 %	55,1 % <sup>e</sup>	53,8 % <sup>e</sup>
Forskel fra placebo (95 % CI)	-	34,9 (22,2; 47,6)	42,6 (30,5; 54,8)	-	46,6 (38,4; 54,8)	45,6 (37,6; 53,6)
Uge 24	11,5 %	50,0 % <sup>e</sup>	62,9 % <sup>e</sup>	9,8 %	68,8 % <sup>e</sup>	60,9 % <sup>e</sup>
Forskel fra placebo (95 % CI)	-	38,6 (25,8; 51,4)	51,7 (39,7; 63,7)	-	58,6 (50,6; 66,6)	51,3 (43,2; 59,3)

<sup>a</sup> p < 0,001 (primært endepunkt)

<sup>b</sup> p < 0,001 (vigtigste sekundære endepunkt)

<sup>c</sup> p = 0,006 (vigtigste sekundære endepunkt)

<sup>d</sup> ikke statistisk signifikant p = 0,086 (vigtigste sekundære endepunkt)

<sup>e</sup> nominel p < 0,001

<sup>f</sup> nominel p = 0,012

<sup>g</sup> ikke formelt testet i den hierarkiske test procedure, nominel p < 0,001 (vigtigste sekundære endepunkt)

<sup>h</sup> defineret som et IGA-respons på 0 ("cleared") eller 1 (minimal) og  $\geq 2$ -grads reduktion i forhold til *baseline* i IGA-psoriasis score

<sup>i</sup> LSMean-ændring = ændring i mindste kvadraters middelværdi

Klinisk respons blev opretholdt op til uge 52, som vurderet ved responsrater for ACR 20/50/70, DAS 28 (CRP), MDA, IGA og PASI 90 i DISCOVER 1 og DISCOVER 2 (se tabel 9).

**Tabel 9: Kliniske responser i DISCOVER 1 og DISCOVER 2 ved uge 52<sup>a</sup>**

	DISCOVER 1		DISCOVER 2	
	guselkumab 100 mg hver 8. uge	guselkumab 100 mg hver 4. uge	guselkumab 100 mg hver 8. uge	guselkumab 100 mg hver 4. uge
<b>ACR 20</b>				
N <sup>b</sup>	112	124	234	228
% respons	67,9 %	75,8 %	79,1 %	75,9 %
<b>ACR 50</b>				
N <sup>b</sup>	113	124	234	228
% respons	43,4 %	55,6 %	51,3 %	49,1 %
<b>ACR 70</b>				
N <sup>b</sup>	114	124	234	228
% respons	28,9 %	29,8 %	29,5 %	28,1 %
<b>Ændring i DAS 28 (CRP) fra baseline</b>				
N <sup>c</sup>	112	123	234	227
Middelværdi (SD)	-2,03 (1,250)	-1,99 (1,062)	-2,08 (1,121)	-2,11 (1,128)
<b>MDA</b>				
N <sup>b</sup>	112	124	234	228
% respons	33,9 %	40,3 %	32,9 %	36,8 %
<b>Patienter med <math>\geq 3</math> % BSA og IGA <math>\geq 2</math> ved baseline</b>				
<b>IGA-respons</b>				
N <sup>b</sup>	75	88	170	173
% respons	69,3 %	83,0 %	77,1 %	84,4 %
<b>PASI 90</b>				
N <sup>b</sup>	75	88	170	173
% respons	66,7 %	76,1 %	77,1 %	81,5 %

<sup>a</sup> Der var ingen placebo-gruppe efter uge 24.

<sup>b</sup> Evaluerbare deltagere med observeret respons.

<sup>c</sup> Deltagere med en observeret ændring fra baseline.

Klinisk respons blev opretholdt op til uge 100, som vurderet ved responsrater for ACR 20/50/70, DAS 28 (CRP), MDA, IGA og PASI 90 i DISCOVER 2 (se tabel 10).

**Tabel 10: Klinisk respons i DISCOVER 2 ved uge 100<sup>a</sup>**

	guselkumab 100 mg hver 8. uge	guselkumab 100 mg hver 4. uge
<b>ACR 20</b>		
N <sup>b</sup>	223	219
% respons	82,1 %	84,9 %
<b>ACR 50</b>		
N <sup>b</sup>	224	220
% respons	60,7 %	62,3 %
<b>ACR 70</b>		
N <sup>b</sup>	224	220
% respons	39,3 %	38,6 %
<b>Ændring i DAS 28 (CRP) fra baseline</b>		
N <sup>c</sup>	223	219
Middelværdi (SD)	-2,37 (1,215)	-2,36 (1,120)
<b>MDA</b>		
N <sup>b</sup>	224	220
% respons	44,6 %	42,7 %
<b>Patienter med <math>\geq 3</math> % BSA og IGA <math>\geq 2</math> ved baseline</b>		
<b>IGA-respons</b>		
N <sup>b</sup>	165	170
% respons	76,4 %	82,4 %




PASI 90		
N <sup>b</sup>	164	170
% respons	75,0 %	80,0 %

- a Der var ingen placebo-gruppe efter uge 24.  
b Evaluerbare deltagere med observeret respons.  
c Deltagere med en observeret ændring fra *baseline*.

### Respons over tid


I DISCOVER 2 blev der observeret et større ACR 20-respons i begge guselkumab-grupper sammenlignet med placebo så tidligt som uge 4, og behandlingsforskellen fortsatte med at stige over tid til og med uge 24 (figur 5).

**Figur 5: ACR 20-respons efter besøg til og med uge 24 i DISCOVER 2**




I DISCOVER 2 blev ACR 20-respons opretholdt fra uge 24 til uge 52 for forsøgspersoner, som fik fortsat behandling med guselkumab ved uge 24 (se figur 6). ACR 20-respons blev opretholdt fra uge 52 til uge 100 for forsøgspersoner, som fik fortsat behandling med guselkumab ved uge 52 (se figur 7).

**Figur 6: ACR 20-respons efter besøg fra uge 24 til og med uge 52 i DISCOVER 2**



**Figur 7: ACR 20-respons efter besøg fra uge 52 til og med uge 100 i DISCOVER 2**



Observerede responser i guselkumab-grupperne var ens uafhængigt af samtidig brug af csDMARD, herunder MTX (DISCOVER 1 og 2). Desuden afdækkede undersøgelse af alder, køn, race, legemsvægt og tidligere brug af csDMARD (DISCOVER 1 og 2) samt tidligere brug af anti-TNF $\alpha$  (DISCOVER 1) ikke forskelle i respons på guselkumab blandt disse undergrupper.

I DISCOVER 1 og 2 blev der påvist forbedringer i alle komponenter af ACR-scoringer, herunder patientens vurdering af smerter. Ved uge 24 i begge studier var andelen af patienter, som havde opnået et modificeret PsARC-respons (PsA *response criteria response*) større i guselkumab-grupperne sammenlignet med placebo. PsARC-responser blev opretholdt fra uge 24 til uge 52 i DISCOVER 1 og til uge 100 i DISCOVER 2.

Dactylitis og entesitis blev vurderet på baggrund af puljerede data fra DISCOVER 1 og 2. Ved uge 24 var andelen af patienter med reduktion af dactylis hos forsøgspersoner, som havde dactylitis ved *baseline*, større i den gruppe, der fik guselkumab hver 8. uge (59,4 %, nominal  $p < 0,001$ ) og hver 4. uge (63,5 %,  $p = 0,006$ ), sammenlignet med placebo (42,2 %). Ved uge 24 var andelen af patienter med reduktion af entesitis blandt forsøgspersoner, som havde entesitis ved *baseline*, større i den gruppe, der fik guselkumab hver 8. uge (49,6 %, nominal  $p < 0,001$ ) og hver 4. uge (44,9 %,  $p = 0,006$ ) sammenlignet med placebo (29,4 %). Ved uge 52 var andelen af forsøgspersoner med reduktion af dactylis (81,2 % i den gruppe, der fik behandling hver 8. uge, og 80,4 % i den gruppe, der fik behandling hver 4. uge) og reduktion af entesitis (62,7 % i den gruppe, der fik behandling hver 8. uge, og 60,9 % i den gruppe, der fik behandling hver 4. uge) opretholdt. I DISCOVER 2 var andelen af forsøgspersoner med reduktion af dactylis og entesitis ved *baseline* (91,1 % i den gruppe, der fik behandling hver 8. uge, og 82,9 % i den gruppe, der fik behandling hver 4. uge) og reduktion af entesitis (77,5 % i den gruppe, der fik behandling hver 8. uge, og 67,7 % i den gruppe, der fik behandling hver 4. uge) opretholdt ved uge 100.

I DISCOVER 1 og 2 udviste patienter, som fik behandling med guselkumab, og som havde spondylitis med perifer artrit som deres primære præsentation, større forbedring i forhold til *baseline* i BASDAI (*Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index*) sammenlignet med placebo i uge 24. Forbedring i BASDAI blev opretholdt fra uge 24 til uge 52 i DISCOVER 1 og til uge 100 i DISCOVER 2.

#### Radiografisk respons

I DISCOVER 2 blev hæmning af progression af strukturel skade målt radiografisk og udtrykt som middelændringen i forhold til *baseline* i total modificeret van der Heijde-Sharp (vdH-S)-score. Ved uge 24 udviste den gruppe, der fik guselkumab hver 4. uge, en statistisk signifikant mindre radiografisk progression og guselkumab hver 8. uge udviste numerisk mindre progression end placebo (tabel 11). Den observerede fordel med doseringsregimet med guselkumab hver 4. uge på hæmning af radiografisk progression (dvs. mindre middelændring i forhold til *baseline* i total modificeret vdH-S-score i den gruppe, der fik behandling hver 4. uge, *versus* placebo) var mest udtalt hos forsøgspersoner med både en høj værdi for C-reaktivt protein og et stort antal led med erosioner ved *baseline*.

**Tabel 11: Ændring i forhold til *baseline* i total modificeret vdH-S-score ved uge 24 i DISCOVER 2**

	N	LS-middelændring <sup>c</sup> (95 % CI <sup>d</sup> ) i forhold til <i>baseline</i> i modificeret vdH-S-score ved uge 24
Placebo	246	0,95 (0,61; 1,29)
guselkumab 100 mg hver 8. uge	248	0,52 <sup>a</sup> (0,18; 0,86)
guselkumab 100 mg hver 4. uge	245	0,29 <sup>b</sup> (-0,05; 0,63)

<sup>a</sup> ikke statistisk signifikant  $p = 0,068$  (vigtigste sekundære endepunkt)

<sup>b</sup>  $p = 0,006$  (vigtigste sekundære endepunkt)

<sup>c</sup> LS-middelændring = ændring i middelværdi efter mindste kvadraters metode

<sup>d</sup> CI = konfidensinterval

Ved uge 52 og uge 100 var middelændringen i forhold til *baseline* i total modificeret vdH-S score i de grupper, der fik guselkumab hver 8. uge og hver 4. uge (tabel 12).

**Tabel 12: Ændring i forhold til *baseline* i total modificeret vdH-S-score ved uge 52 og uge 100 i DISCOVER 2**

	N <sup>a</sup>	Middelændring (SD) <sup>b</sup> i forhold til <i>baseline</i> i total modificeret vdH-S-score
<b>Uge 52</b>		
guselkumab 100 mg hver 8. uge	235	0,97 (3,623)
guselkumab 100 mg hver 4. uge	229	1,07 (3,843)
<b>Uge 100</b>		
guselkumab 100 mg hver 8. uge	216	1,50 (4,393)
guselkumab 100 mg hver 4. uge	211	1,68 (7,018)

<sup>a</sup> Evaluerbare deltagere med en observeret ændring i den pågældende periode

<sup>b</sup> SD = standardafvigelse

Bemærk: ingen placebo-gruppe efter uge 24

### Fysisk funktion og helbredsrelateret livskvalitet

I DISCOVER 1 og 2 viste patienter, der fik behandling med guselkumab, signifikant forbedring ( $p < 0,001$ ) i fysisk funktion sammenlignet med placebo, som vurderet ved HAQ-DI (*Health Assessment Questionnaire-Disability Index*) ved uge 24. Forbedringer i HAQ-DI blev opretholdt fra uge 24 til uge 52 i DISCOVER 1 og til uge 100 i DISCOVER 2.

Der blev observeret en signifikant større forbedring i forhold til *baseline* i SF-36 *Physical Component Summary*-score (PCS) hos patienter, der fik behandling med guselkumab, sammenlignet med placebo ved uge 24 i DISCOVER 1 ( $p < 0,001$  for begge dosisgrupper) og DISCOVER 2 ( $p = 0,006$  for den gruppe, der fik behandling hver 4. uge). Ved uge 24 blev der observeret en større stigning i forhold til *baseline* i FACIT-F (*Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue*)-score hos patienter, der blev behandlet med guselkumab, sammenlignet med placebo i begge studier. I DISCOVER 2 blev der observeret større forbedringer i helbredsrelateret livskvalitet som målt ved DLQI (*Dermatology Life Quality Index*) hos patienter, som fik behandling med guselkumab, sammenlignet med placebo ved uge 24. Forbedringer i SF-36 PCS-, FACIT-F- og DLQI-scores blev opretholdt fra uge 24 til uge 52 i DISCOVER 1 og til uge 100 i DISCOVER 2.

### Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med Tremfya i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med plaque-psoriasis og psoriasisartrit (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

## **5.2 Farmakokinetiske egenskaber**

### Absorption

Efter en enkelt 100 mg subkutan injektion hos raske forsøgspersoner nåede guselkumab en gennemsnitlig ( $\pm$  SD) maksimal serumkoncentration ( $C_{max}$ ) på  $8,09 \pm 3,68$   $\mu\text{g/ml}$  med ca. 5,5 dage efter dosering.

*Steady-state* serumkoncentration af guselkumab blev opnået i uge 20 efter subkutan administration af 100 mg guselkumab i uge 0 og 4 og hver 8. uge herefter. Den gennemsnitlige ( $\pm$  SD) serumkoncentration af guselkumab for *steady-state*, var i to fase III-studier med patienter med plaque-psoriasis  $1,15 \pm 0,73$   $\mu\text{g/ml}$  og  $1,23 \pm 0,84$   $\mu\text{g/ml}$ .

Guselkumabs farmakokinetik hos patienter med psoriasisartrit svarede til den hos patienter med psoriasis. Efter subkutan administration af 100 mg Tremfya ved uge 0, 4 og derefter hver 8. uge var middelværdien for *steady-state* dalserumkoncentrationen af guselkumab også ca. 1,2  $\mu\text{g/ml}$ . Efter subkutan administration af 100 mg Tremfya hver 4. uge var middelværdien for *steady-state* dalserumkoncentrationen af guselkumab ca. 3,8  $\mu\text{g/ml}$ .

Den absolutte biotilgængelighed af guselkumab efter en enkelt subkutan injektion af 100 mg blev estimeret til 49 % hos raske forsøgspersoner.

#### Fordeling

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen i løbet af den terminale fase ( $V_z$ ) efter en enkelt intravenøs administration til raske forsøgspersoner lå i intervallet ca. 7 til 10 l på tværs af studierne.

#### Biotransformation

Den nøjagtige metaboliske omsætning af guselkumab er ikke blevet karakteriseret. Som et humant IgG-mAb forventes guselkumab at blive nedbrudt til små peptider og aminosyrer via kataboliske veje på samme måde som endogent IgG.

#### Elimination

Gennemsnittet for systemisk clearance (Cl) efter en enkelt intravenøs administration til raske forsøgspersoner lå i intervallet 0,288 til 0,479 l/dag på tværs af studierne. Den gennemsnitlige halveringstid ( $T_{1/2}$ ) for guselkumab var ca. 17 dage hos raske forsøgspersoner og ca. 15 til 18 dage hos patienter med plaque-psoriasis på tværs af studierne.

Farmakokinetiske populationsanalyser indikerede, at samtidig brug af NSAID'er, orale kortikosteroider og csDMARD'er som f.eks. methotrexat ikke påvirkede guselkumabs clearance.

#### Linearitet/non-linearitet

Den systemiske eksponering for guselkumab ( $C_{max}$  og AUC) steg på en tilnærmelsesvis dosisproportional måde efter en enkelt subkutan injektion ved doser fra 10 mg/kg til 300 mg/kg hos raske forsøgspersoner eller patienter med plaque-psoriasis.

#### Ældre patienter

Der er ikke udført specifikke studier hos ældre patienter. Af de 1 384 patienter med plaque-psoriasis, som blev eksponeret for guselkumab i kliniske fase III-studier og medtaget i den farmakokinetiske populationsanalyse, var 70 patienter 65 år eller ældre, herunder 4 patienter, der var 75 år eller ældre. Af de 746 patienter med psoriasisartrit, som blev eksponeret for guselkumab i kliniske fase III-studier, var i alt 38 patienter 65 år eller ældre, og ingen patienter var 75 år eller ældre.

Farmakokinetiske populationsanalyser af patienter med plaque-psoriasis og psoriasisartrit indikerede ingen tilsyneladende ændringer i estimater af Cl/F hos patienter  $\geq 65$  år sammenlignet med patienter  $< 65$  år, hvilket tyder på, at det ikke er nødvendigt at justere dosis til ældre patienter.

#### Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Der er ikke udført et specifikt studie for at fastlægge virkningen af nedsat nyre- eller leverfunktion på guselkumabs farmakokinetik. Renal elimination af intakt guselkumab, et IgG-mAb, forventes at være lav og af mindre betydning. På samme måde forventes nedsat leverfunktion ikke at påvirke clearance af guselkumab, da IgG-mAb'er hovedsagelig elimineres via intracellulær katabolisme.

### **5.3 Non-kliniske sikkerhedsdata**

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, reproduktionstoksicitet samt præ- og postnatal udviklingstoksicitet.

I studier med gentagne doser givet til cynomolgusaber var guselkumab veltolereret via intravenøse og subkutane administrationsveje. En ugentlig subkutan dosis på 50 mg/kg til aber medførte eksponerings- (AUC) og  $C_{max}$ -værdier, som var henholdsvis mindst 49 og  $> 200$  gange højere end dem, der blev målt i det farmakokinetiske populationsstudie med mennesker. Endvidere var der ingen farmakologiske bivirkninger relateret til immuntoksicitet eller kardiovaskulær sikkerhed under udførelsen af toksicitetsstudiet med gentagne doser eller i et målrettet farmakologisk studie af kardiovaskulær sikkerhed hos cynomolgusaber.

Der blev ikke observeret nogen præ-neoplastiske ændringer i histopatologiske vurderinger af dyr, som blev behandlet i op til 24 uger, eller efter en restitutionsperiode på 12 uger, hvorunder lægemidlet kunne påvises i serum.

Der er ikke udført mutagenicitets- eller karcinogenicitetsstudier med guselkumab.

Guselkumab kunne ikke påvises i modermælk fra cynomolgusaber målt på dag 28 efter fødslen.

## **6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER**

### **6.1 Hjælpstoffer**

Histidin  
Histidin-monohydrochlorid-monohydrat  
Polysorbat 80  
Saccharose  
Vand til injektionsvæsker

### **6.2 Uforligeligheder**

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

### **6.3 Opbevaringstid**

2 år.

### **6.4 Særlige opbevaringsforhold**

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.  
Opbevar den fyldte injektionssprøjte eller den fyldte pen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

### **6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser**

#### Tremfya 100 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

1 ml opløsning i en fyldt injektionssprøjte af glas med en fastsiddende kanyler og en kanylehætte, samlet i en automatisk kanylerbeskyttelse.

Tremfya leveres i en pakning, som indeholder en fyldt injektionssprøjte og i en multipakning, som indeholder 2 (2 pakninger med 1) fyldte injektionssprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

#### Tremfya 100 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

1 ml opløsning i en fyldt injektionssprøjte af glas samlet i en fyldt pen med automatisk kanylerbeskyttelse.

Tremfya leveres i en pakning, som indeholder en fyldt pen, og i en multipakning, som indeholder 2 (2 pakninger med 1) fyldte penne.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering**

Når den fyldte injektionssprøjte eller den fyldte pen er taget ud af køleskabet, skal den forblive i den ydre karton, mens den får lov at nå stuetemperatur. Dette opnås ved at vente i 30 minutter før injektion af Tremfya. Den fyldte injektionssprøjte eller den fyldte pen må ikke omrystes.

Før brug anbefales en visuel inspektion af den fyldte injektionssprøjte eller den fyldte pen. Opløsningen skal være klar, farveløs til let gul og kan indeholde nogle få små hvide eller gennemsigtige partikler. Tremfya må ikke bruges, hvis opløsningen er uklar eller misfarvet, eller hvis den indeholder store partikler.

Hver pakning med Tremfya har en „Brugsanvisning“, som i detaljer beskriver klargøring og administration af den fyldte injektionssprøjte eller den fyldte pen.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

## **7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN**

Janssen-Cilag International NV  
Turnhoutseweg 30  
B-2340 Beerse  
Belgien

## **8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)**

EU/1/17/1234/001 1 fyldt injektionssprøjte  
EU/1/17/1234/002 1 fyldt pen  
EU/1/17/1234/003 2 fyldte penne  
EU/1/17/1234/004 2 fyldte injektionssprøjter

## **9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN**

Dato for første markedsføringstilladelse: 10. november 2017

## **10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN**

01/2022

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside <http://www.ema.europa.eu/>.