

Informieren Sie umgehend Ihren Arzt, wenn Sie eines dieser Symptome bemerken. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Behandlung haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Deutschland
Janssen-Cilag GmbH
Johnson & Johnson Platz 1
41470 Neuss
Tel.: 0800 086 9247 /
+49 2137 955 6955
jancil@its.jnj.com

Version 1.1, Stand September 2024

Es ist wichtig, dass Sie Ihren verschreibenden Arzt sofort über eine Schwangerschaft oder über alle Nebenwirkungen, die möglicherweise während der Behandlung mit Yuvanci auftreten, informieren.

Behandlungszentrum:

Name des verordnenden Arztes:

Telefonnummer des verordnenden Arztes:

Patientenkarte zur sicheren Anwendung



Yuvanci

Filmtabletten
Macitentan/Tadalafil

Zur Behandlung der pulmonal arteriellen Hypertonie

Diese Karte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie während der Behandlung mit Yuvanci beachten müssen.

Tragen Sie diese Karte immer bei sich und zeigen Sie sie jedem Arzt, der an Ihrer medizinischen Versorgung beteiligt ist.

Diese Patientenkarte wurde als risikominimierende Maßnahme beauftragt und mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) abgestimmt. Sie soll sicherstellen, dass Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen von Macitentan/Tadalafil kennen und berücksichtigen.

10 mg/20 mg

10 mg/40 mg



Schwangerschaft

Yuvanci kann die Entwicklung des ungeborenen Kindes schädigen. Daher dürfen Sie Yuvanci nicht einnehmen, wenn Sie schwanger sind, und Sie dürfen auch nicht schwanger werden, während Sie Yuvanci einnehmen. Außerdem kann eine Schwangerschaft, wenn Sie an pulmonal arterieller Hypertonie leiden, die Symptome Ihrer Erkrankung erheblich verschlimmern.

Empfängnisverhütung

Sie müssen während der Einnahme von Yuvanci eine zuverlässige Methode der Empfängnisverhütung (Kontrazeption) anwenden.

Besprechen Sie unbedingt alle Fragen, die Sie möglicherweise haben, mit Ihrem Arzt.

Sie müssen vor Beginn der Behandlung mit Yuvanci und monatlich während der Behandlung einen Schwangerschaftstest durchführen (lassen), auch wenn Sie denken, dass Sie nicht schwanger sind.

Wie andere Arzneimittel dieser Klasse kann Yuvanci Auswirkungen auf die Leber haben. Ihr Arzt wird vor Beginn der Behandlung mit Yuvanci und während der Behandlung Bluttests durchführen, um zu untersuchen, ob Ihre Leber richtig arbeitet.

Anzeichen dafür, dass Ihre Leber möglicherweise nicht richtig arbeitet:

- Übelkeit (Brechreiz)
- Erbrechen
- Fieber (erhöhte Körpertemperatur)
- Magenschmerzen (Bauchschmerzen)
- Gelbsucht (Gelbfärbung der Haut oder der Bindehaut im Auge)
- Dunkelfärbung des Urins
- Hautjucken
- Lethargie oder Fatigue (ungewöhnliche Müdigkeit oder Erschöpfung)
- grippeartige Beschwerden (Gelenk- und Muskelschmerzen mit Fieber)