

Karta pacjenta stosującego lek CARVYKTI®▼ (cyltakabtagen autoleucel)

▼ Ten produkt leczniczy podlega dodatkowemu monitorowaniu. Pozwoli to na szybką identyfikację nowych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Pracownicy ochrony zdrowia proszeni są o zgłaszanie wszelkich podejrzewanych działań niepożądanych.

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA:

Kontakt w nagłych wypadkach

IMIĘ I NAZWISKO
OPIEKUNA PACJENTA:

NUMER TELEFONU
OPIEKUNA PACJENTA:

ZAGNIJ TUTAJ

Lekarz prowadzący terapię CAR-T

IMIĘ I NAZWISKO
LEKARZA:

NUMER TELEFONU
LEKARZA:

ADRES
OŚRODKA CAR-T:

NUMER TELEFONU
OŚRODKA CAR-T:

ZAGNIJ TUTAJ

Ważne informacje dla pacjentów

Należy zawsze mieć tę kartę przy sobie. Należy okazać ją każdemu lekarzowi, który przeprowadza badanie, oraz podczas wizyty w szpitalu. Należy poinformować każdego pracownika ochrony zdrowia, który wykonuje jakiegokolwiek czynności medyczne, że pacjent był leczony cyltakabtagenem autoleucelem. Należy zaplanować pobyt w pobliżu szpitala, w którym pacjent był leczony, przez co najmniej 4 tygodnie po podaniu cyltakabtagenu autoleucelu. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn przez co najmniej 8 tygodni po podaniu cyltakabtagenu autoleucelu. Więcej informacji można znaleźć w Ulotce Informacyjnej dla Pacjenta.

ZAGNIJ TUTAJ

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nowych objawów, zwłaszcza objawów wymienionych na tej karcie, należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego, personel medyczny lub innego obecnego pracownika ochrony zdrowia. Cyltakabtagen autoleucel może powodować ciężkie działania niepożądane w różnych częściach ciała. Objawy te mogą zagrażać życiu lub nawet prowadzić do śmierci i wymagają natychmiastowej interwencji.

Objawy, które wydają się łagodne, mogą szybko się pogorszyć. Objawy mogą pojawić się z opóźnieniem, nawet kilka tygodni po podaniu leku.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym:

Zespół uwalniania cytokin (CRS)

- Gorączka (38°C lub wyższa)
- Dreszcze
- Szybkie bicie serca
- Trudności w oddychaniu
- Zawroty głowy lub uczucie zamroczenia

ZAGNIJ TUTAJ

Toksyczność neurologiczna

- Uczucie splątania
- Uczucie zmniejszonej czujności, dezorientacji, niepokoju lub utraty pamięci
- Trudności w mówieniu lub niewyraźna mowa
- Spowolnienie ruchów lub zmiany w piśmie odręcznym

Informacje do wypełnienia przez zespół terapeutyczny

Proszę przekazać tę kartę zespołowi terapeutycznemu CAR-T, aby mógł ją wypełnić i zwrócić Państwu.

DATA PODANIA

Pacjent otrzymał cyltakabtagen autoleucel, który jest terapią komórkami T z chimerycznym receptorem antygenowym (terapia CAR-T) stosowaną w leczeniu szpiczaka mnogiego.

Nr serii (Lot)

ZAGNIJ TUTAJ

Ważne informacje dla pracowników ochrony zdrowia

Pacjent otrzymał zmodyfikowany autologiczny produkt do immunoterapii komórkami T, który może powodować ciężki, a nawet śmiertelny zespół CRS oraz toksyczność neurologiczną. CRS może obejmować dowolny układ i narząd. Należy ocenić pacjenta pod kątem objawów CRS i toksyczności neurologicznej.

Pełne informacje znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

ZAGNIJ TUTAJ

Przed podjęciem jakiegokolwiek leczenia należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym pod numerem telefonu podanym na pierwszej stronie karty.

Pacjent nie powinien oddawać krwi, narządów, tkanek ani komórek do przeszczepów.