

Remicade infliksymab Karta Przypominająca dla Pacjenta Imię i nazwisko pacjenta: Imię i nazwisko lekarza: Numer telefonu lekarza: Niniejsza karta przypominająca dla pacjenta zawiera ważne informacje, z których należy zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekiem Remicade. Niniejszą kartę należy okazywać każdemu lekarzowi prowadzącemu leczenie. Należy uważnie przeczytać „Ulotkę Informacyjną” leku Remicade przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem. Data rozpoczęcia terapii lekiem Remicade: Bieżące podania: Ważne jest, aby pacjent i lekarz zapisali nazwę handlową i numer serii przyjmowanego leku. Należy poprosić lekarza o wpisanie typu i daty ostatniego badania w kierunku gruźlicy (TB): <table border="0"> <tr> <td>Badanie</td> <td>Badanie</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>Wynik:</td> <td>Wynik:</td> </tr> </table> Udając się do fachowego personelu medycznego, należy zawsze mieć ze sobą listę wszystkich innych leków przyjmowanych przez pacjenta. Rodzaje uczuleń: Lista innych leków:	Badanie	Badanie	Data	Data	Wynik:	Wynik:	Zakażenia Przed leczeniem lekiem Remicade - Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma infekcję nawet bardzo łagodną - Jest bardzo ważne, aby poinformować lekarza o przebytej gruźlicy lub bliskim kontakcie z osobą chorą na gruźlicę. Lekarz wykona badania w kierunku gruźlicy. Należy poprosić lekarza o zapisanie na karcie typu i daty ostatniego badania w kierunku gruźlicy - Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub podejrzewa, że jest nosicielem wirusowego zapalenia wątroby typu B. W czasie leczenia lekiem Remicade - Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli pojawią się objawy infekcji. Objawy te obejmują: gorączkę, uczucie zmęczenia, (utrzymujący się) kaszel, duszność, utratę masy ciała, nocne poty, biegunkę, rany, problemy dotyczące zębów, uczucie pieczenia w trakcie oddawania moczu lub objawy grypopodobne. Ciąża, karmienie piersią i szczepienia - W przypadku przyjmowania leku Remicade w okresie ciąży lub podczas karmienia piersią, ważne jest, aby poinformować o tym lekarza pediatrę przed podaniem dziecku jakiegokolwiek szczepionki. Dziecko nie powinno otrzymywać żadnej szczepionki zawierającej żywe drobnoustroje, takiej jak BCG (stosowanej w celu zapobiegania gruźlicy) w ciągu 12 miesięcy po porodzie, ani podczas karmienia piersią, chyba że lekarz, który zajmuje się dzieckiem zaleci inaczej. Kartę należy zachować przez 4 miesiące od daty przyjęcia ostatniej dawki leku Remicade lub w przypadku gdy kobieta jest w ciąży przez 12 miesięcy po porodzie. Działania niepożądane mogą wystąpić długo po przyjęciu ostatniej dawki leku Remicade.
Badanie	Badanie						
Data	Data						
Wynik:	Wynik:						