

Karta Pacjenta

Strona 1

W leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego

Ta karta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których należy pamiętać podczas leczenia lekiem Yuvanci. Należy zawsze nosić tę kartę przy sobie i pokazywać ją każdemu lekarzowi zaangażowanemu w leczenie pacjenta.

Yuvanci® 10 mg/20 mg
Yuvanci® 10 mg/40 mg
Macytentan/tadalafil
tabletki powlekane

Strona 2

Ważne jest, aby natychmiast zgłosić lekarzowi prowadzącemu ciążę lub jakiegokolwiek działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Yuvanci.

Ośrodek prowadzący leczenie:

Nazwisko lekarza prowadzącego:

Numer telefonu lekarza prowadzącego:

Strona 3

Ciąża

Lek Yuvanci może zaszkodzić rozwojowi płodu. Dlatego nie wolno przyjmować leku Yuvanci, jeśli pacjentka jest w ciąży, oraz nie wolno zajść w ciążę podczas przyjmowania leku Yuvanci. Ponadto, jeśli pacjentka choruje na tętnicze nadciśnienie płucne, zajście w ciążę może bardzo nasilić objawy choroby.

Strona 4

Antykoncepcja

Podczas przyjmowania leku Yuvanci należy stosować niezawodną metodę antykoncepcji. Wszelkie wątpliwości należy omówić z lekarzem.

Należy wykonać test ciążowy przed rozpoczęciem stosowania leku Yuvanci i co miesiąc podczas leczenia, nawet jeśli pacjentka uważa, że nie jest w ciąży.

Strona 5

Podobnie jak inne leki z tej grupy, lek Yuvanci może wpływać na wątrobę. Lekarz wykona badania krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Yuvanci i w trakcie leczenia, aby ocenić, czy wątroba pracuje prawidłowo.

Objawy, że wątroba może nie pracować prawidłowo to m.in.:

- nudności
- wymioty
- gorączka
- ból brzucha
- żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówki oczu)
- ciemne zabarwienie moczu
- świąd skóry
- senność lub zmęczenie (nietypowe zmęczenie lub wyczerpanie)
- zespół grypopodobny (ból stawów i mięśni z gorączką)

Strona 6

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących leczenia należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.